



Document de travail à affiner

Ne pas mettre les racines à nues, donc il faut garder un peu de l'ancien substrat.
Tailler très modestement dans les racines.
Vaporiser dans les mois qui suivent un rempotage pour limiter la chute des aiguilles.

| Arbres | Travaux | Observations | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|------|---|--|-----------------------|---------|------|-----------|------------|----------|----------|--|
| Cèdre atlantica Glauca | Rempotage | 70% pouzzo + 30 % écorces ou 1/3 sable + 1/3 Compost + 1/3 pouzzo | | 3 à 5 ans | | | | | | | | | | | |
| | Emplacement | Rustique | * Au froid mais racines "hors gèle" | Soleil | | | Mi ombre (la motte doit sécher mais pas pas totalement entre deux arrosages) | | | | Soleil | Au froid * | | | |
| | Taille | Arbre en culture | Structure | | | | | | | | | | | | |
| | | Arbre abouti | Structure | | | | | | | | | | | | |
| | Pincement | Arbre en culture | | | | | | | | | | | | | |
| | | Arbre abouti | | | | Pincer fort (ne laisser qu'1/3 du rameau) | | Pincement d'entretien | | | | | | | |
| | Désaiguillage / MEKIRI | Arbre en culture | | | | | | | | | | | | | |
| | | Arbre abouti | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligature | Attention aux bourgeons | Surveiller | LIBERER | | | | | | | POSER | | | | |
| Fertilisation | apport minéraux 1 fois par mois de mars en septembre | | | + (Corne broyée mais en quantité limitée) | | | - | | | +++ | ++ | + | | | |
| Maladie/traitement | | | Aliette | | | | | Bassinage et mi ombre | | | | Aliette | | | |

Pas de grosse taille l'année d'un rempotage →

Peu azoté pour limiter la taille des aiguilles