

CHARME



| Travaux | Observations | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-----------|---------|-----------|----------|
| Rempotage | Pouzzo 90% Compost 10% | | | 2 à 3 ans | | | | | | | | | |
| Emplacement | Pas à coté des rosiers et des chênes | Au froid (-10° maxi) | | Soleil | | | Mi ombre | | | Soleil | | Au froid | |
| Taille | Arbre en culture | Taille structure | | | | | | | | | | | |
| | Arbre abouti | Taille structure (après la taille, protéger des courants d'air) | | Laisser 8 feuilles puis couper à 2 feuilles | | | effeuillage 1 an sur 2 au maximum | | | | | | Taille |
| pincements | Arbre abouti | | | Branche aboutie, pincer les bourgeons terminaux | | | | | | | | | |
| Fertilisation | Faiblement azoté | | | Pas d'engrais pour limiter la taille des feuilles et les entre-nœuds. | | ++ | ++ | - | - | + | + | | |
| Ligature | à surveiller de près | Poser les grosses ligatures uniquement (cime par exemple) | | | Surveiller et/ou libérer | Poser les ligatures de branches | | | | Libérer | | | |
| Maladie/traitement | Oïdium + chenille, araignées rouges | | | Mancozèbe + soufre (tous les mois) | | | | | | | | Mancozèbe | |

Les branches faibles seront laissées libres de pousser, les branches fortes seront taillées régulièrement pour limiter leur taille.