

©Bonsai Gallery of Walter Pall:
Mugo Pine nr. 2



MUGHO

Sur un pin,
un seul gros travail par an.

J'ajoute des orties fraîches hachées et du charbon de bois maison en petits morceaux au fond des contenants pour éviter la pourriture des racines.

Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rempotage	80% pouzzo + 20 % écorces ou 60% Pomice + 40% zéolithe ou 60% Pouzzolane + 40% zéolithe				2 à 3 ans								
Emplacement	Rustique	Au froid		Plein soleil <i>(les arbres rempotés ou travaillés seront mis à l'ombre jusqu'à reprise)</i>							Au froid		
Taille	Arbre en culture		Structure										
	Arbre aboutis											Structure	
Pincement	Arbre en culture										Sélection des bourgeons		
	Arbre aboutis				Au moment où les aiguilles apparaissent								
Désaiguillage / MEKIRI	Arbre en culture							DESAIG.	OU	DESAIG.			
	Arbre aboutis							DESAIG. <i>Equilibrer les forces. Ne pas toucher aux braches</i>					
Ligature	Attention aux bourgeons				LIBERER						POSER		
Fertilisation	4/6/8 au printemps et à l'automne ou mieux encore 0/10/10 en automne	-	-	-	+++			-		+++	++	+	-
Maladie/traitement	Araignées rouges		Aliette: 2 pulvérisations à 3 semaines d'intervalles				Bassinage					Aliette	

Le pincement permet d'équilibrer la force de l'arbre. Il ne faut surtout pas toucher au zone faible. L'intervention ne peut se faire que sur les zone forte

Ne pas toucher aux aiguilles de l'année. Pour les aiguilles de 2 ans, au besoin, on peut les couper aux ciseaux pour éviter d'arracher l'écorce. Les aiguilles plus anciennes viennent à la main en tirant vers le bout de la branche.