

Attention il faut alléger la cime des jeunes plans et privilégier la pousse des branches basses pour garantir la conicité du tronc

Arbres	Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>Mélèze</b>	Rempotage	70% zéolite + 30 % écorces			Tous les ans en culture, puis deux à trois ans								Si besoin à cause d'une forte pousse	
	Emplacement	Protéger des courants d'air pour limiter le dessèchement	* Au frais mais hors courant d'air		Plein soleil				Protéger du plein soleil si trop fort		Plein soleil		*	
	Taille	Arbre en culture		Structure										
		Arbres aboutis		Structure				Taille d'entretien						
	Pincement	Arbre en culture					Surtout la cime							
		Arbres aboutis					Partout et plusieurs fois au besoin sauf les branches faibles							
	Déaiguillage / MEKIRI	Arbre en culture												
		Arbres aboutis												
	Ligature	Privilégier les haubans					Poser				Libérer			
		Ligatures	Poser				Surveiller				Libérer			
Fertilisation	Equilibré				+++				+	+++	++	+		
Maladie/traitement	Cochenille, rouille.			Aliette			Bassinage						Aliette	

Quand l'arbre est jeune, les ligatures peuvent être posées très tôt, pour faire les premières mises en forme, mais le bois de mélèze est joueur, et quand on relâche la ligature, la branche a tendance à remonter au fil du temps. Régulièrement un haubanage peut devenir nécessaire pendant plusieurs années

