

Thunbergii

Pin noir du Japon

Il va de soit que l'arbre doit être en parfaite santé, et qu'il est préférable de ne pas cumuler les gros travaux

Travaux		Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rempotage		POZZOLANE			3 à 5 ans		Taille au ciseaux les branches faibles puis 10 à 12 jours après, les branches fortes							
Emplacement		Rustique	Au froid	Soleil			Soleil				Soleil	Au froid		
Taille	Arbre en culture	Structure			TAILLE des chandelles									
	Arbre aboutis	Structure					Taille d'équilibrage des rameaux trop forts							
Pincement	Arbre en culture			Selection des bourgeons								Sélection des bourgeons		
	Arbre aboutis											Selection bourgeons		
Désaiguillage / MEKIRI	Arbre en culture	Desaiguillage pour équilibrer les zones							DESAIG.			Mekiri possible (mais bof)	Nettoyage des aiguilles mortes	
	Arbre aboutis									DESAIG.				
Ligature	Attention aux bourgeons	POSER	Surveiller, au besoin libérer et reposer							LIBERER				
Fertilisation	0/10/10 en automne						+++		-		+++	+++	+++	
Maladie/traitement	Manque de fer													
	Araignées rouges			Aliette				Bassinage tout l'été					Aliette	

Sur les rameaux forts on ne gardera que 3 à 5 paires d'aiguilles, sur les rameaux faibles, on en laissera plus (7 à 9)

Commencer par les bourgeons faibles, puis forts (bout de branche) 2 à 4 semaines plus tard.

Il est possible de laisser marquer légèrement les ligatures pour provoquer un bourgeonnement arrière, mais cela ne fonctionne que combiné avec une excellente culture et beaucoup de soleil.

Une autre méthode, que je teste sur un petit plant, consiste à désaiguiller avant le gonflement des bourgeons en gardant 7 à 9 paires d'aiguilles partout. Ce sont les bourgeons qui bénéficient du surplus d'énergie cette fois ci et pas les aiguilles qui restent comme quand on désaiguille en été.

