



BONSAÏ : GUIDES PRATIQUES
<http://artbonsai.org/>

Calendrier d'entretien
Les bonsaï au fil des saisons
Version du 9 août 2007

FRÉDÉRIC BRIDEL

Le Printemps



FIG. 1 – Au printemps, vos bonsaï recommencent un nouveau cycle végétatif.
Photographie licence Creative commons 2.0 by-sa

Profitez de la vitalité printannière de vos arbres pour effectuer des opérations lourdes, telles que rempotage, taille des feuilles, ou scarification des troncs.

Augmentez les arrosages, excepté pour les arbres qui ont été rempotés ou sévèrement taillés en fin d'hiver.

Recommencez à fertiliser les bonsaï qui n'ont pas été rempotés. Pour ces derniers, il est conseillé d'attendre six à huit semaines après la taille des racines. En début de printemps, jusqu'au mois de mai, utilisez un engrais azoté (NPK 10-5-5, par exemple). En fin de printemps, ne donnez pas d'engrais à un bonsaï défolié. Alternez l'engrais solide et liquide : solide une fois par mois, liquide 2 à 3 fois par mois.

Vous pouvez commencer à sortir les bonsaï d'intérieur¹ en milieu de printemps, lorsque les gelées sont passées, bien sûr. Il faut impérativement que la température extérieure dépasse 14°C, y compris la nuit.

Le printemps est la bonne période pour la taille de type *Metsumi*². Commencez à tailler les pousses des feuillus. Pincez les chandelles des pins d'avril à mi-mai. Commencez le ligaturage des caducs en fin de printemps, vers la mi-juin. Vous pouvez effectuer des bouturage de conifères et de feuillus.

Surveillez l'état sanitaire des vos bonsaï. Commencez les traitements fongicides à titre préventif, la chaleur et l'humidité relatives favorisent l'apparition de maladies. Effectuez des traitements insecticides si nécessaire.

C'est la bonne époque pour effectuer des opérations lourdes de formation des troncs. Voir à ce sujet l'article du site *Principes & méthodes pour faire grossir les troncs des bonsaï*.

Les rempotages des feuillus doivent impérativement être terminés fin mars, ceux des conifères fin avril. Les bonsaï d'origine tropicale pourront être rempotés en été.

¹Ce terme est en fait un abus de langage. Voir à ce sujet *le guide de survie de vos bonsaï*

²Taille destinée à conserver la forme des arbres matures

L'été



FIG. 2 – L'été est la saison où l'activité végétative de vos bonsaï est la plus intense.
Photographie © Rick Aiello, licence Creative commons 2.0 by-sa

En été, l'opération la plus importante est l'arrosage de vos arbres. Surveillez particulièrement vos mame-bonsaï³ ainsi que tous les arbres plantés dans des coupes extra-plates. Les bonsaï à l'extérieur, selon le volume de terre, doivent être arrosés quotidiennement, voire deux à trois fois par jour, par bassinage⁴. Arrosez le sol autour des pots de vos bonsaï afin d'augmenter l'humidité ambiante.

Si vous avez oublié d'arroser

Si vous avez oublié d'arroser un bonsaï et que son substrat est complètement sec, procédez par trempage : trempez brièvement votre bonsaï dans une bassine d'eau, de façon à humidifier l'ensemble de la motte racinaire. Les fois suivantes, recommencez à arroser de façon normale, en pluie fine.

Si le temps n'est pas trop chaud (au dessous de trente-cinq degrés), continuez à donner de l'engrais, en réduisant les doses en juillet et en août. Vous rencontrerez parfois dans la littérature spécialisée le conseil « Jamais d'engrais en juillet-août ! », conseil impératif et non négociable. La raison est que l'engrais diminue l'absorption des racines alors que l'arbre perd beaucoup d'eau par évaporation. En fait, on peut nuancer ce conseil : Si vous habitez dans une région aux étés tempérés et relativement pluvieux, continuez à donner de l'engrais à vos bonsaï sans crainte pour leur santé. Si vous résidez dans une région aux étés brûlants et secs, arrêtez la fertilisation en juillet-août.

En été, les bonsaï d'intérieur seront placés ... à l'extérieur. Leur croissance en sera plus vigoureuse.

Continuez la taille des feuillus et des genévriers. En fin d'été, vers mi-septembre, retirez les ligatures des caducs et des conifères.

Comme au printemps, continuez les traitements fongicides à titre préventif et les traitements insecticides si nécessaire.

En été, Aucun rempotage ne doit être effectué sur les arbres d'extérieur. Les bonsaï d'origine tropicale pourront être rempotés si nécessaire.

³Ce terme désigne les bonsaï miniatures

⁴arrosage en pluie fine, par le dessus

L'automne



FIG. 3 – En automne, la croissance de vos bonsaï décroît fortement, et par conséquent leurs besoins en engrais et en eau.

Photographie © Peter Gawthrop, licence Creative commons 2.0 by-nc

Cette période permet à vos arbres de se préparer à la saison froide. Les arrosages doivent être réduits car la température diminue. Augmentez l'arrosage de vos bonsaï d'intérieur à partir du moment où vous recommencerez à chauffer votre domicile.

Donnez de l'engrais jusqu'à la fin de la période de croissance, c'est à dire jusqu'à la chute des feuilles pour les bonsaï d'extérieur (caducs), mi-octobre pour les conifères. La croissance des bonsaï d'intérieur ralentit également, aussi vous continuerez à donner de l'engrais, mais à des doses réduites.

Mettez les bonsaï d'intérieur à l'abri des températures les plus froides. Les bonsaï d'origine tropicale doivent être impérativement protégés des gelées.

L'automne est également la saison du Mekiri⁵. Les branches des bonsaï qui ont bien poussé peuvent être taillées vers le mois de septembre. Cela favorisera l'apparition de nouveaux bourgeons au printemps suivant.

Un nettoyage des arbres peut être envisagé : Retirez les aiguilles jaunies des conifères et les feuilles tombées des arbres caducs.

Le ligaturage peut être commencé sur les conifères.

Aucun rempotage ne doit être effectué en automne. Vos arbres attendront le début du printemps.

L'automne est une saison propice au bouturage des conifères et des feuillus.

Continuez les traitements insecticides si nécessaire et fongicides jusqu'à la fin de la saison de croissance, généralement mi-octobre.

⁵Le Mekiri est la taille de rameaux aoûtés, destinée à augmenter la ramification de l'arbre

L'hiver



FIG. 4 – En hiver, vos bonsaï d'extérieur sont au repos.
Photographie © Lee McArthur, licence Creative commons 2.0 by

La fréquence d'arrosage des bonsaï d'extérieur doit être très faible afin de limiter le risque de gel des racines. Si nécessaire, arrosez le matin afin que la motte de terre ait le temps de ressuyer avant la tombée de la nuit. Les bonsaï d'intérieur gardés en appartement doivent être arrosés assez copieusement, et fertilisés, dans la mesure où la température de nos habitations est assez élevée. Si vos bonsaï d'intérieur passent l'hiver en serre froide — la meilleure solution pour eux —, diminuez la fréquence d'arrosage.

Les apports d'engrais seront stoppés jusqu'au début du printemps, pour les bonsaï d'extérieur et ceux d'intérieur placés en serre froide.

Protégez du gel vos bonsaï d'extérieur, en particulier les miniatures, les plantations sur roche, et de façon générale les arbres plantés dans des coupes très plates. Placez vos bonsaï d'intérieur dans un endroit protégé des courants d'air. Si vous n'avez pas la possibilité de les placer dans un endroit suffisamment éclairé, vous pouvez envisager un éclairage d'appoint grâce à des lampes horticoles, disponibles en jardinerie.

L'hiver est la période appropriée pour la taille de structure sur les caducs. De façon plus générale, c'est l'époque idéale pour décider l'orientation que vous donnerez à vos bonsaï. N'hésitez pas à vous aider de schémas en repérant le dessin du tronc, la position des branches principales et des zones de feuillage, le dessin général de la poterie, cela pour plusieurs faces. Il ne s'agit pas de réaliser une œuvre d'art, mais de modéliser votre bonsaï.

Vous pouvez continuer le ligaturage des conifères.

Appliquez les traitements d'hiver sur les caducs et les fruitiers.

Aucun rempotage ne doit être effectué en hiver. Vos arbres attendront le début du printemps.

Licence d'utilisation



*Ce document est publié sous licence Creative commons 2.0 by-nc-sa
Les sources au format \LaTeX sont disponibles sur demande à l'auteur
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs*